


No. Los medicamentos de la PEP se deben tomar solamente en situaciones de emergencia.

• Se receta la PEP después de una posible exposición al VIH.

• La PEP no sustituye el uso regular de otros métodos para prevenir la infección por el VIH.

• La PEP no es la opción adecuada para las personas que podrían estar expuestas al VIH con frecuencia.

• Si usted está en riesgo continuo de contraer el VIH como, por ejemplo, a través de la exposición de forma reiterada, hable con su proveedor de atención médica sobre la PrEP (profilaxis preexposición).




Según la razón por la cual le receten la PEP, podría reunir los requisitos para recibir estos medicamentos gratis o a bajo costo.

• Si ha sido víctima de una **agresión sexual**, podría reunir los requisitos para que le reembolsen parcial o totalmente el costo de los medicamentos y la atención médica. Encuentre los recursos que hay en su área: www.justice.gov/ovw/local-resources

• Si cree que estuvo expuesto al **VIH en el trabajo**, el seguro médico de su trabajo o el seguro de compensación al trabajador generalmente pagará por la PEP.

Si usted no puede obtener cobertura con un seguro médico, su proveedor de atención médica puede presentar una solicitud para que reciba la PEP de manera gratuita por medio de uno de los programas de asistencia con los medicamentos que ofrecen los fabricantes. Infórmese más: www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/dep/paying-for-peg.html



¿Qué es la PEP?

PEP, o profilaxis posexposición, significa tomar medicamentos para prevenir la infección por el VIH después de una posible exposición.

La PEP se debe comenzar dentro de las 72 horas (3 días) después de la posible exposición al VIH. Pero cuanto antes comience la PEP, mejor. ¡Cada hora cuenta!



- Si su proveedor de atención médica le receta la PEP, deberá tomar estos medicamentos a diario por 28 días.
- La PEP es eficaz para la prevención del VIH, pero no en un 100 %. Siempre use condones con sus parejas sexuales y practique hábitos de inyección seguros.

1

2



Si usted es VIH negativo o si no sabe si tiene el VIH y en las últimas **72 horas**:

- estuvo posiblemente expuesto al VIH a través de una relación sexual (por ejemplo, si se rompió el condón),
- ha sido víctima de una agresión sexual, o
- ha compartido agujas, jeringas u otro implemento para la inyección de drogas,

hable inmediatamente con su proveedor de atención médica, un médico de la sala de emergencias o un proveedor de atención médica de urgencia acerca de la PEP.



PEP

Si usted puede haber estado expuesto al VIH en las últimas 72 horas (3 días), hable de inmediato con un proveedor de atención médica sobre la PEP.



Para obtener más información sobre la PEP, consulte www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/pep.html y para obtener información general sobre el VIH, llame al **1-800-CDC-INFO (232-4636)**.



¿Es la PEP adecuada para usted?